

Заболеваемость коклюшем у новорожденных

За последние годы более чем **в два раза** снизилась заболеваемость коклюшем среди детей первых месяцев жизни [1]. Главной причиной этому стала проводимая вакцинация беременных женщин.

Вакцинация беременных против коклюша одобрена международным сообществом в 2012 году [2] и в ряде стран уже стала рутинной, хотя в некоторых, к сожалению, всё ещё недоступна.

По данным недавно проведённого исследования в большой когорте детей (2 031 775 чел.), рождённых от матерей, вакцинированных во время беременности, показано, что вакцинация связана с низким уровнем заболеваемости детей коклюшем в первые два месяца жизни (более чем в два раза), низким уровнем госпитализации, возникновения осложнений и смертности от этой инфекции [1].

Маленькие дети слишком малы для того, чтобы вакцинироваться от коклюша. Вакцинация детей против этой инфекции разрешена с 3 месяцев. Учитывая возрастные особенности иммунной системы и рост заболеваемости коклюшем среди населения, риск инфицирования детей является высоким. Однако опасность для них представляет не только инфицирование коклюшной палочкой, но и то, что у новорождённых течение коклюша часто бывает тяжёлым и, порой, с развитием грозных осложнений. Подробнее в статьях [«Почему растёт заболеваемость коклюшем?»](#) и [«Коклюш у грудничков»](#).

Прививка от коклюша рекомендована всем будущим мамам и, по данным исследований, признана эффективной и безопасной [3]. Подробности в статье [«Вакцинация беременных против коклюша»](#).

Источник: <https://pediatricsrus.site/news/zabolevaemost-kokljushem-u-novorozhdennyh/>